

dijagnoza : Epilepsija (nakon jednog EEG nalaza)

Poslao/la MajaK - 13 okt 2014 11:45

Postovani,

Molim Vas da mi objasnite eeg nalaz:

"nalaz u budnom stanju bilježi isnovnu aktivnost od 9 o 10 Hz koja je u okviru alfa trake, vretenaste je modulacije i ublažuje se na otvaranje očiju. Anteriorno se superponuje beta ritam. Za vrijeme HV aktivacije se u jedan mah registruje pojava zaoštrenih i zatamnjenih talasa bez predominacije strane. Tokom IFS se ne registruje promjena osnovne aktivnosti. Svo vrijeme se registruje dobra interhemisferična sinhronija. Zasključak: EEG u budnom stanju bilježi nespecifične promjene aktivirane putem HV.

EEG nakon cjelonoćne deprivacije spavanja: Bilježi osnovnu aktivnost od 9 do 10 Hz koja je u okviru alfa trake, vretenaste je modulacije i ublažuje se na otvaranje očiju. Tokom pregleda se u nekoliko navrata registruju paroksizmi šiljak-talas, višestruki šiljak-talas kompleksa, sa anteriornim maksimumom i bez kliničkih promjena. Nije učinjena aktivacija putem HV, dok se tokom IFS registruje fotoparoksizmalni odgovor, najizraženiji pri učestalosti odblijesa od 20sek. Tokom pregleda je zaspao kada se u fazi 1 NREM spavanja registruju oštri verteksni talasi nad centralnim derivacijama, te nepotpuni paroksizmi šiljak talasa i višestrukih šiljak kompleksa, sa anteriornim maksimumom. U fazi 2NREM spavanja se ispisuju fazni fenomeni spavanja K kompleksi i vretena spavanja. Zaključak: EEG nalaz u budnom stanju i spavanju bilježi bilateralne epileptiforme paroksizme sa anteriornim maksimumom. Fazni fenomeni spavanja se uredno prikazuju. Dostignuta je faza 2 NREM spavanja:

Dijagnoza :Epilepsia idiopathica generalisata et syndrome epilepticae

Peridontitis pulpae apicalis acuta, status post k 04.4

Status post extractionem

Haemorrhagio post extractionem

Da li je u redu ova dijagnoza- u pitanju je dječak od 16,5 godina a "napadu" je prethodilo vadenje kutnjaka sa komplikacijom - (40 minuta pokušaj vadenja zuba sa cistom) jako krvarenje, 10 sati intervencija stomatologa, 3 vrste anestezija, brufen 600, eritromicini 500mg 2 kom, ricinol u d.meso...

Pitam kao roditelj koji se ne može pomiriti sa dijagnozom da narednih 5-6 godina pije lijek Keppra 1500 mg dnevno.... napadi se nisu ponovili nakon tog izolovanog napada a nije ih bilo ni prije.

S postovanjem

=====